

## 治療後の 経過

- ・照射直後、当日はやけどをしたように腫れて多少の痛みを伴います。
- ・強い腫れは2.3日で引き、その後約10日前後かけて徐々に引いてきます。
- ・当てた部分（特に目の周りや口周囲など）によっては、照射後に内出血をおこし赤紫色になることもあります。
- ・照射1週間程度でかさぶたができます。  
処置を続けながら自然に取れるのを待ちます。
- ・かさぶたが取れるのは、照射後7日から2週間程度です。  
かさぶたが取れた後は2週間から4週間程度赤みがのこります。

### レーザー後の色素沈着について

かさぶたが取れたのち、  
20%の方は色素沈着もなく治療前より薄くなりますが、  
80%の方は再発と思われるような色素沈着が  
現れることがあります。  
これは一過性の炎症後色素沈着である場合が多く、  
時期は人によって異なり、照射後すぐの方もいれば、  
2ヶ月程度経過してから出てくることもあります。  
通常3ヶ月から半年程度かけて徐々に色が薄くなります。  
その間、日焼けをしないように注意してください。



### ～レーザー後のケア方法について～

- ・照射した当日から洗顔は可能です。  
泡立てた石鹼でこすらないように優しく洗ってください。
- ・レーザー後は肌が敏感な状態ですので、  
洗顔後、化粧水・乳液・美容クリーム等は塗らずに、  
処方された軟膏をぬり、ガーゼや絆創膏で保護してください。
- ・かさぶたが自然にとれても、取れなくても、2週間は必ず軟膏を外用し、  
ガーゼもしくは絆創膏で保護してください。かさぶたを無理にはがすと  
傷がついたり、色素沈着が新たにできてしまうので注意してください。
- ・かさぶたが取れるまでは、治療した部位の化粧は控えてください。
- ・照射した部位は半年程度、日焼けをしないように注意してください。

